

Erste Hilfe

FIRST AID KIT FOR PETS


Handy

- -> Tierarzt
- -> Tierklinik
- -> Tierrettung
- -> tierärztlicher Notdienst
- -> Ortungssystem
- -> Feuerwehr 112
- -> ggf. Versicherungs-Nr. bei vorhandener Krankenund/oder OP-Versicherung





Anruf bei TA/Klinik

- -> Was ist passiert?
- -> Was wurde gemacht?
- -> Versicherung
- -> ungefähre Ankunft bei TA/Klinik
- -> Besondere Maßnahmen (z.B. Angsthund)
- -> Maulschlaufe (https://youtu.be/wcvMp7VwaW0)
- -> Infos wann zuletzt gefüttert
- -> Infos über regelmäßige Medikamentengaben



https://youtu.be/OiY225qtERQ





Hund nicht über den Rücken drehen -> Magendrehung

Keine Atmung / Puls feststellbar

- Auf die rechte Seite legen
- Zunge aus dem Maul legen


Herzmassage

- Handbreit hinter der Achsel
- 20 Wiederholungen


Beatmung


- Ggf. Papiertaschentuch über's Maul legen –
 Beatmung über die Nase, Brustkorb beobachten
- 2 Wiederholungen

https://youtu.be/wp5SQbXoeGA









Druckverband bei starken Blutungen

- Als Druckpolster kann u.a. dienen:
- -> eine Mullbinde
- -> bei gr. Wunden am Rumpf z.B. Geldbörse
- -> immer eine Kompresse zu allererst auf die Wunde legen

 Man kann nicht genug aufpassen

- Holz / Knochen / Steine
- Spielzeug / Batterien
- Löffel / Strümpfe / Handschuhe
- Nägel / Schrauben / Muttern
- Büroklammern / Heftzwecke
- Angelhaken
- Schnur / Seil / Kabel
- Meisenknödel mit Netz
- Teelicht / Küchenmagnete
- Kronkorken

• Giftköder

- Rattengift
- Glas / Nägel
- Polizei / Ordnungsamt informieren
- Warnschilder
- Falls noch Köder vorhanden, bitte einpacken und mit zum TA nehmen

Symptome

- Würgen / Schnauze reiben
- Leeres Schlucken / Maul steht offen
- Niesen / Husten
- Atemgeräusche / Atemnot
- Erbrechen / Kotabsatzprobleme
- Verweigerung Futter / Wasser
- Mattigkeit
- Schleim bleibt am
 Fieberthermometer haften
 nach rektalem
 Temperaturmessen

Notfallmaßnahmen

- Wenn möglich, noch aus dem Maul nehmen
- Falls Schnur im Kot sichtbar wird – nicht ziehen!
- Evtl. in Absprache mit dem TA Sauerkraut geben oder Schlagsahne / Joghurt
- Taucht der Gegenstand nach 24 h nicht auf -> TA
- Nicht selbst zum Erbrechen bringen
- Gegenstand in den Atemwegen (s. Erstickungsanfall)

AndereKörperbereiche

- Holzspieß z.B. in Brustkorb
- NICHT ENTFERNEN
- Steril mit Verbandszeug versorgen
- Fremdkörper abpolstern
- Granne in der Nase starkes Niesen mit Blutbeimischung
- Evtl. auch Granne im Auge / Ohr / Pfote

Prävention

- Klein kleinteiligesSpielzeug
- Keine Steine oder Stöckchen werfen
- Nicht ohne Aufsicht
 Knochen / Kopfhaut
 oder sonstige Kauartikel
 kauen lassen
- Generelle Training z. B. draußen nichts aufzunehmen



















Erste Hilfe beim Hund

Copyright: www.tierheilpraxis-meisters.com



Allgemeines



- Teilweise durchblutet und innerviert
- Das nennt man das ,Leben'
- Nutzen sich normalerweise selbst ab, nicht jedoch die Daumen- oder Afterkrallen
- Wenn zu lang schneiden, da sie einwachsen können
- Kralle ist vom Krallenbett umschlossen
- Wenn die Krallen beim Stehen den Boden berühren, sind sie zu lang
- Krallenschneiden /-schleifen kann man selbst machen

Daumen-/Afterkrallen

- Vorne Daumenkrallen
- Hinten Afterkralle (kann auch doppelt auftreten (z.B. Baucerone)
- Keine Beteiligung am Bewegungsablauf
- Knöcherne Verbindung kann vorhanden sein, dann dürfen sie auch nicht amputiert werden.

Ursachen

- Auf die Pfote getreten
- In Türe eingeklemmt
- Unfall
- Hängengeblieben z.B.
 Metallgitter
- Niemals mit einem Hund die Rolltreppe nutzen
- Bei Krallenpflege versehentlich geschnitten
- u.v.m.

Symptome

- Pfote wird geschont
- Belecken
- Blutige Pfote
- Kralle gespalten bis zum Leben
- Kralle herausgerissen oder gebrochen
- Krallenbettentzündung
- Krallen zu weit abgelaufen z.B. Asphalt
- Kralle verdreht
- Daumen- oder Afterkrallen abgerissen

Copyright: www.tierheilpraxis-meisters.com

- Notfallmaßnahmen
- Reinigen der Pfote


- Mit klarem, sauberem Wasser
- Haare vorsichtig zurückschneiden
- Desinfizieren z.B. mit kolloidalem
 Silber oder Desinfektionsmittel

Untersuchen der Krallen

- Bei guter Beleuchtung
- Definitiv nur Kralle oder doch mehr
- Krallenbett auch betroffen
- Liegt evtl. größere Pfotenverletzung vor?

Pfotenverband

- Sollte immer mal wieder trocken geübt werden
- s. Chart Pfotenverband













https://youtu.be/os-fie-lvHc



Erste Hilfe beim Hund

Heilungsphase

- Ggf. Leckschutzkragen
- Pfotenschuh
- Schonen
- Regelmäßiger Verbandswechsel
- Gründliche Wundbehandlung
- Ggf. lasern beim THP
- Notfallhilfe: Kaisernatron (s. Chart Kaisernatron)

Prävention

- Gerade im Winter immer die Pfoten gut abwaschen
- Im Spätsommer auf Grannen achten
- Pfoten und Krallen immer gut kontrollieren
- Achtung bei dornigen Waldböden

Transport zum TA

- Blutung ist nicht zu stillen
- Nahe am Krallenbett gebrochen
- Bei eingewachsenen Daumenoder Afterkrallen
- Verdacht auf Infektion (Röte Schwellung – Schmerzhaftigkeit)
- Im Zweifelsfall immer zum TA

Was ist passiert?



- Verschlucken eines Fremdkörpers
- Insektenstich
- Setzt Atemstillstand ein, folgt der Herzstillstand

Symptome

- Husten
- Röcheln
- Evtl. Atemgeräusche
- Ggf. Schock

Notfallmaßnahme

- Kleine Hunde kopfüber hochhalten und etwas hin und her schwenken
- Große Hunde zwischen den Schulterblättern klopfen, damit sich der Gegenstand löst
- Löst er sich nicht, dann wie auf dem Bild anheben und ruckartig etwas fallen lassen – gut gesichert
- Fahrt zum TA

- Notfallmaßnahme
- Atemweg freihalten
- Ggf. Reanimation
- Fremdkörper aus dem Rachen entfernen, wenn es möglich ist!

Heimlich-Griff

- Absoluter Notfallgriff
- Man steht hinter dem Hund
- 5 x kräftig zw. die Schulterblätter klopfen
- Wir legen unseren Oberkörper auf den Rücken des Hundes, Handballen auf den Unterbauch des Hundes
- Dann ziehen wir das Tier ruckartig an uns und erzeugen eine Schubbewegung vom Zwerchfell zum Rachen, um einen Überdruck in der Lunge zu erzeugen. Kann 5 x wiederholt werden
- Spuckt der Hund nichts aus, muss sofort der Mundraum überprüft werden, um zu sehen, ob der Fremdkörper nach oben gerutscht ist und entfernt werden kann.



Hitzschlag

Hintergrundinfos

- Hunde sind hitzeempfindlich
- Weniger Schweißdrüsen in der Oberhaut
- Regulation der Körpertemperatur über Hecheln und Schweißabsonderung über die Pfoten
- Hecheln verbraucht Energie und Wasser
- Ab 41 43 °C Lebensgefahr

Hitzschlag

Hitzschlag / Sonnenstich

- Sonnenstich -> Gehirn erfährt direkte Sonneneinstrahlung (im Auto hinter der Heckscheibe)
- Hitzschlag -> gesamter Körper, allgemeine Umgebungstemperatur Überwärmung d. gesamten Körpers, Hund muss nicht der Sonne ausgesetzt sein.
- Keine Thermoregulation mehr möglich
- Sonnenstich -> Gefahr einer Störung der Blutversorgung des Gehirns bis hin zur Hirnblutung
- Kombination von beidem möglich.

Hitzschlag

Hund im Auto

- Wettlauf mit der Zeit
- Zeit wird schnell verkannt
- Bei Welpen liegen die Grenzen deutlich tiefer
- Außentemperaturen:

24 °C -> 31 °C nach ,nur' 10 min.

26 °C -> 33 °C

28 °C -> 35 °C

30 °C -> 46 °C nach 30 min, nach 1 Std.

56 °C

Symptome

Hitzschlag

- Starkes Hecheln
- Beschleunigter Puls
- Schnelle flache Atmung
- Erhöhte Körpertemperatur
- Tiefrote Zunge
- Evtl. blasse Schleimhäute
- Glasiger Blick
- Augen wirken eingefallen
- Erbrechen
- Krämpfe
- Gleichgewichtsstörungen
- Bewusstlosigkeit
- Bewusstseinsstörungen

Copyright: www.tierheilpraxis-meisters.com

Vitalwerte



- Schleimhäute kontrollieren kapillare Rückflusszeit
- Puls
- Atmung
- Flüssigkeitsmangel
- Schock?

Notfallmaßnahmen

Hitzschlag

- Sofort in kühlere Umgebung verbringen
- Wasser anbieten, aber nicht einflößen
- Immer in einer kleinen Schale anbieten
- Bei Schock erhöht lagern Notfall Akupunkturpunkt
- Stressvermeidung

Hitzschlag

Maßnahmen zur Abkühlung

- Auf ein feuchtes Tuch legen
- Feuchtes Tuch über den Kopf und Hals legen
- Pfoten anfeuchten von unten nach oben
- Nach 10 min. Tücher erneuern
- Pfoten ständig gut einnässen
- Kalte Kompressen in die Leisten
- Sollte ein Bach o.ä. in der Nähe sein, darf der Hund darin waten, wenn er sich noch selbständig bewegen kann.

Allgemeines

- Vermeidbarer Notfall
- Nicht in der Hitze anbinden
- Spaziergänge zu kühleren Zeiten
- Reichlich Trinkwasser
- Keine sportlichen Aktivitäten!

Hundstage

- Ggf. nur zum Lösen raus
- Achtung Wintergärten
- Aktivitäten vermeiden
- Aufgeheizter Asphalt
- Scheren nur bei Rassen, deren Fell rassespezifisch geschoren werden soll, nicht bei doppeltem Haarkleid

Reisen

- Autopanne / Unfall / Stau
- Notration Wasser / Handtücher
- Sonnenblenden / Scheibenverdunklung
- Sonnenstich auch bei klimatisiertem Auto möglich

Auto

- NIE im Auto lassen
- Auch nicht, wenn es diesig erscheint
- Geöffnete Fenster reichen nicht aus
- Gleiches gilt für WoMo/Caravan

- Wasser
- Wenn der Hund gerne schwimmt – perfekt
- Ggf. mit Schwimmweste
- Achtung Strand etc. ein Hund muss schattig liegen können





Silber außen – Schutz vor Hitze von außen




Silber innen – Schutz vor Wärmeverlust

Erste Hilfe beim Hund

Knochenbruch

Symptome



- Unnormale
 Beweglichkeit der
 Gliedmaße
- Schwellung
- Möglicherweise sichtbare offene Verletzung
- Möglicherweise Knochen (-splitter) sichtbar
- Blutung
 Copyright: www.tierheilpraxis-meisters.com



Gefahren

- Verschlechterung des Zustands
- Bewusstlosigkeit
- Blutverlust
- Schock

 Notfallmaßnahmen

- Sofort Klinik informieren
- Offenen Bruch nicht schienen
- Bei Bewusstlosigkeit
 - NotfallAkupunkturpunkt
 - Schutz vor Auskühlen Thermodecke
 - hochlagern beiSchock
- Offener Bruch -> Wunde mit sterilem Tuch abdecken und leichten Verband nur zum Schutz anlegen

Selbstschutz


- Maulschlaufe anlegen

 auch der liebste
 Hund kann unter
 Schmerzen beißen.

 Medicaltraining ist immer positiv für solche Situationen zu bewerten
- Ein Hund kann unter Schmerzen heftigst reagieren. Evtl. andere Hunde vor Ort unbedingt wegführen.

Transport zum TA

- Wenn der Hund noch selbst auf drei Beinen laufen möchte, bitte selbst zum Auto laufen lassen.
- Im Auto vorsichtig lagern



Erste Hilfe beim Hund

Copyright: www.tierheilpraxis-meisters.com

Magendrehung

- Symptome
- Transport zum TA!!!

- Typisch aufgeblähter Bauch
- Unruhe, läuft viel hin und her
- Klein Platz ist recht
- Appetitlosigkeit
- Speichelfluss
- Erfolgloses Würgen, erfolgloser Versuch von Kotabsatz
- Bauch schwillt trommelartig an
- Atemnot
- Teilnahmslosigkeit bis Schock
- Stark erhöhter Puls
- Vornehmlich abends / nachts

Magendrehung

- Risikofaktoren
- Transport zum TA!!!

- FamiliäreDisposition
- Erhöhte
 Futterschüssel
- Füttern einer großen Tagesration
- Trockenfutter
- Stress
- Mit zunehmendem Alter
- Kastration
- Großer tiefer Brustkorb

Magendrehung

- Folgen
- Transport zum TA!!!

- Magenein- und -ausgang blockiert
- Bildung von Fäulnisgasen
- Druck auf das Zwerchfell
- Magengewebe kann absterben
- Perforation
- Milz kann sich mit drehen
- Lebensbedrohlicher
 Schock

Zuhause



- Medikamente
- Drogen
- Haushaltsreiniger
- Zigaretten
- Lebensmittel
 - Schokolade
 - Zwiebeln / Knoblauch
 - Macadamianüsse
 - Weintrauben / Rosinen
 - Auberginen / Tomaten
 - Erdnüsse / Walnüsse (schwarz)
 - Kaffee
 - Muskatnuss
 - Xylit Zuckerersatzstoff z.B. in Kaugummis (tödlich in geringster Dosis)
- Die Menge macht das Gift!

Unterwegs

- Rattengift
- Blaukorn
- Streusalz
- An Gift verendet Nagetiere
- Giftköder
- Pferdeäpfel (MDR1-Defekt)
- Gülle
- Schlangenbiss
 - blaue Verfärbung der Haut
 - Schwellung

Garten / Garage

- Frostschutz
- Öl
- Haushaltsreiniger
- Lösungsmittel
- Farben / Lacke
- Dünger
- Giftige Gartenpflanzen
 - Kirschlorbeer
 - Efeu

Silvester

- Blindgänger
- Illegale Feuerwerkskörper
- Quecksilberverbindungen

Symptome

- Unruhe
- Erbrechen (evtl. schaumig)
- Durchfall
- Blasses Zahnfleisch
- Unregelmäßiger Herzschlag
- Speicheln / Schmatzen
- Blut im Urin und/oder Kot
- Einblutungen im Auge
- Krämpfe / Muskelzittern
- Unsicherer Gang
- Teilnahmslosigkeit / Bewusstlosigkeit
- Absinken der Körpertemperatur

- Zu beachten!
- Transport zum TA

- Nicht selbst zum Erbrechen bringen
- Keine Maulschlaufe anlegen
- Falls möglich, das Gift mit zum TA nehmen (ggf. auch Erbrochenes bzw. Kot)
- Atemweg frei halten

Verbrennung

- Notfall
- Transport zum TA



- Wunde mit kaltem Wasser spülen, falls vorhanden wäre isotonische Kochsalzlösung ideal
- Wunde feucht abdecken und Kühlkompresse auflegen

Ertrinken

- Notfall
- Transport zum TA



- Hund kopfüber hochheben und vorsichtig schütteln, damit die Flüssigkeit herauskommt.
- Den Brustkorb reiben und das Abhusten damit forcieren
- Stets die Vitalfunktionen kontrollieren
- Ggf. Reanimation
- Ggf. gegen Unterkühlung schützen

Unterkühlung

- Notfall
- Transport zum TA



- Zittern
- Puls ist erniedrigt
- Schleimhäute oftmals blass
- Muskelsteifigkeit
- In Decken wickeln und den Hund rubbeln und somit langsam wärmen